

Korrektion af hudoverskud bryst, ryg og arme:

Til forundersøgelsen skal du sammen med kirurgen aftale, på hvilken måde din operation skal foregå. Vi vil her oplyse de forskellige måder, hvorpå en korrektion af bryst-, ryg- og armområdet kan foregå, men husk på at der er individuelle behov og operationen kan udføres forskelligt, for at du kan opnå det bedste resultat.

Alle operationer foregår i fuld narkose og tager 2-4 timer. Indlæggelse vil være til dagen efter.

- Korrektion af brysterne med et brystløft inkl (fjernelse af brystkirtel hos mænd)
- Korrektion af brysterne med et brystløft, huden fra ryg anvendes til fylde i brysterne
- Korrektion af ryg, der fjernes hudoverskud svarende til skulderbladene
- Korrektion af armene, fjernelse af hudoverskud på indersiden af overarmene, fra albue til armhule, som kan suppleres med fedtsugning

Brystløft hos kvinder

Efter stort vægttab er brystet blevet meget mobilt og brystvævet er fordelt over et stort område. Brystløftet efterlader derfor et længere ar under brystet, specielt ud under armhulen. Der vil være ar omkring brystvorte. Ved brystløft løftes brystvorten og kirtelvævet og den overskydende hud fjernes. Huden på ryggen kan fjernes i samme operation. Det kræver, at du bliver vendt under bedøvelsen.

Brystløft hos mænd

Efter stort vægttab er huden for brystkassen ofte slap og strækker sig helt om på ryggen. Brystvorten hænger ofte lavt. Ved svær overvægt sker der ændring i hormonerne og der udvikles brystkirtel, som ikke forsvinder efter vægttab. Kan fjernes sammen med et brystløft. Brystvorten flyttes op til normal højde og den løse hud på brystkassen og evt. på ryggen fjernes. Dette kræver, at du bliver vendt under bedøvelsen. Begge operationer hos kvinder og mænd efterlader et ankerlignende ar på brystområdet og et tværgående ar henover skulderbladsområdet.

Overarm

Fjernelse af hudoverskud på indersiden af overarme, kan suppleres med fedtsugning, så man bevarer så mange lymfekar som muligt. Det minimerer risikoen for hævelse af arm og hånd efter operationen.

Mulige komplikationer

Til forundersøgelsen bliver du informeret om mulige komplikationer af speciallægen, inden du beslutter dig for operation.

Forholdsregler, udskrivelse, ambulant kontrol

Se patientinformationen "Fjernelse af hudoverskud efter massivt vægttab"

Varighed

Du skal være opmærksom på, at holdbarhedstiden af resultatet varierer meget fra patient til patient afhængig af genetiske forhold, vævsforhold, ydre forhold, levevis, svingende vægt etc.

Den forventede varighed af behandlingsresultatet vil formentlig kunne ses resten af livet, men forhindrer ikke de almindelige fortløbende aldersforandring.

Har du spørgsmål efter udskrivelsen og inden næste kontrol, er du velkommen til at kontakte os på de udleverede telefonnr.

Du har ret til at have bisiddere med til konsultationen.

Læs venligst Almene forholdsregler ved plastikkirurgiske operationer grundigt.